

# Zavod za kliničku mikrobiologiju - Odjel za bakteriologiju i bolničke infekcije

## Uzimanje uzoraka

### **Uzorci iz primarno sterilnih materijala**

**Na uputnici obavezno navesti slijedeće:**

- podatci o pacijentu (ime i prezime, godina rođenja, odjel)
- dijagnoza
- da li pacijent uzima antimikrobnu terapiju, ako da koju
- vrsta uzorka (kod hemokultura označiti broj seta)
- vrsta pretrage
- datum i vrijeme uzimanja uzorka
- ime nadležnog liječnika

<b>UZORAK</b>	<b>Posuda</b>	<b>Uzimanje materijala</b>	<b>Transport (odmah po uzimanju)</b>	<b>Pohranjivanje (samo ako transport nije moguć odmah)</b>	<b>Očekivani patogeni (kultivacija ne uključuje <i>M. tuberculosis</i>)</b>
Krv- 2-3 seta u 24 sata	Bujoni za hemokulture (istovremeno uzeti set - bočica za AE i AN uzgoj smatraju se jednim uzorkom) odrasli – 10 ml po bočici djeca- 1-5 ml po bočici  Kod sumnje na intracelularne patogene (bartonela) od laboratorija zatražiti Isolator bočice i u njima dostaviti krv	Prije venepunkcije kožu dezinficirati 70% alkoholom i poslije to mjesto više ne palpirati Uzeti 2 do 3 uzorka u razmacima od 1/2h s različitim mjesta, prije očekivanog maksimuma temperature U akutnoj sepsi uzeti 2 seta s različitim mjesta unutar 10 min (prije početka antimikrobne terapije) Kod sumnje na kateter sepsu uzeti uzorak krvi iz periferije i cvk – svakako naznačiti vrijeme uzimanja uzorka	ST	+ 37 C	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)  Nalaz se izdaje za 5 dana ukoliko prije nije bio pozitivan  Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na brucelozu, tularemiju i gljivičnu infekciju (i naznačiti na uputnici)
Kateteri (NE urinarni)	Sterilna posuda s navojem	Dezinfcirati kožu prije vađenja (70% alkohol) vrh urinarnog katetera ne slati na	ST	+4 C (po mogućnosti)	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Pozitivni rezultati se javljaju telefonom

(kateter)		analizu vrh i.v. katetera ne slati u bujonu!		ne dulje od 2 sata)	(preliminarni i definitivni)
Tjelesne tekućine (zglobna, pleuralna, amnionska, ascites, žuć, itd)	Sterilna epruveta s navojem  Iznimno, ako uzorka ima malo, može se nasaditi u bočicu za hemokulturu*	Dezinfcirati kožu prije aspiriranja (70% alkohol) BRIS nije adekvatan uzorak, već SAMO aspirat Poslati što je moguće više materijala	ST	ST / 24 sata  * nasađena bočica za hemokulturu na + 37 C	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Amnionska tekućina i tekućina dobivena kuldocentezom trebaju se slati u anaerobnom transportnom mediju  Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)  Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)
Likvor	Sterilna epruveta s navojem (min.1 ml, za acidorezistentne uzročnike 5 ml)	Dezinfcirati kožu prije aspiriranja (70% alkohol). Uzeti po 1-2 ml u tri epruvete (za mikrobiologiju, citologiju i biokemiju – epruvetu za mikrobiologiju nikad ne puniti prvu, ako samo 1 epruveta prvo ju odnjeti na mikrobiologiju)  Ako je moguće odmah pri uzimanju nekoliko kapi likvora direktno nasaditi i u epruvetu s kosim agarom te epruvetu s hranjivim bujom koji se dobiju u laboratoriju*	ST  Zbog hitnosti pretrage likvor se predaje iz ruke u ruku!	ST  *Nasađene hranjive podloge na +37 C  Za bakteriologiju ne stavljati u hladnjak !	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)  Nalaz se izdaje za 5 dana ukoliko prije nije bio pozitivan  Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)  Rutinska obrada ne uključuje tuš preparat i preparat po Ziehl-Neelsenu (po potrebi naznačiti na uputnici)
Bioptati	Sterilna posuda s navojem (dodati par kapi sterilne fiziološke otopine da tkivo bude	Dezinfcirati kožu prije biopsije (70% alkohol)	ST	ST / 24 sata  dodatni materijal za moguće buduće	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

	vlažno)			analize sačuvati na -70 C	Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)
Aspirat (bris) duboke rane, apscesa	a) Aspirat poslati u sterilnoj epruveti. Ako je uzorka malo ili se ne može odmah otpremiti u laboratorij nasaditi u bočicu za anaerobnu hemokulturu  b) Bris je loš uzorak, ali ako se uzima pohraniti ga u anaerobni transportni medij	Dezinficirati kožu prije aspiriranja (70% alkohol).  Aspirirati duboko u otvorenu ranu, najbolje s dna ili stjenke apscesa ili incidirati komad tkiva  Tkivo ili tekućina bolji su uzorak od brisa  U slučaju male količine aspiriranog materijala navući u špricu malu količinu sterilne fiziološke otopine i proštreati u sterilnu epruvetu ili bočicu za hemokulturu*	ST	ST / 24  *aspirat u bočici za hemokulturu na +37 C	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)  Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)
Kožne promjene, površinske rane (celulitis, opeklne)	Bris u sterilnoj epruveti  U slučaju duljeg transporta pohraniti u Amies transportni medij	Prije uzimanja brisa područje izaprati sterilnom fiziološkom otopinom  Obrisati rub prema zdravom tkivu, odstraniti kruste	ST	ST / 24 sata	<i>S.aureus</i> , BHS-A i gljive se izdaju ako su prisutni u bilo kojoj količini (u tom slučaju preliminarni i definitivni nalaz se javljaju telefonom)  Ostale bakterije se izdaju samo ako predstavljaju dominantnu floru ili zbog rezistencije zahtjevaju kontaknu izolaciju pacijenta  Saprofitne bakterije kože se ne izdaju
Krv na <i>Aspergillus</i> <td>Krv u epruveti bez antikoagulansa</td> <td>Prije venepunkcije kožu dezinficirati 70% alkoholom i poslije to mjesto više ne palpirati</td> <td>ST</td> <td>Test se radi iz svježe krvi – ukoliko uzorak nije moguće poslati odmah odvojiti serum i pohraniti na -20°C</td> <td><i>Aspergillus</i> antigen (galaktoman)</td>	Krv u epruveti bez antikoagulansa	Prije venepunkcije kožu dezinficirati 70% alkoholom i poslije to mjesto više ne palpirati	ST	Test se radi iz svježe krvi – ukoliko uzorak nije moguće poslati odmah odvojiti serum i pohraniti na -20°C	<i>Aspergillus</i> antigen (galaktoman)

ST = sobna temperatura

## Uzorci iz dišnog sustava

### Na uputnici obavezno navesti slijedeće:

- podatci o pacijentu (ime i prezime, godina rođenja, odjel)
- dijagnoza
- da li pacijent uzima antimikrobnu terapiju, ako da koju
- vrsta uzorka
- vrsta pretrage
- datum i vrijeme uzimanja uzorka
- ime nadležnog liječnika

UZORAK	Posuda	Uzimanje materijala	Transport (odmah po uzimanju)	Pohranjivanje (samo ako transport nije moguć odmah)	Očekivani patogeni (kultivacija ne uključuje <i>M. tuberculosis</i> )
Aspirat ili bris srednjeg uha	Sterilna posuda s navojem ili bris u sterilnoj epruveti	Uzorak uzeti samo ako uho curi ili je učinjena timpanocenteza	ST	ST / 24 sata  Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom mediju	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na gljive (naznačiti na uputnicu)
Bris vanjskog uha	Bris u sterilnoj epruveti	Prije uzimanja brisa odstraniti kruste fiziološkom otopinom; bris rotirati u vanjskom kanalu	ST	24 sata na +4 C	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva OSIM: Saprofitne bakterije kože se ne izdaju
Bris spojnice oka	Bris u sterilnoj epruveti	Prvim sterilnim štapićem odstraniti sluz, a drugim uzeti obrisak pazeći da se ne dotakne kožni dio vjede	ST	ST / 24 sata  Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom mediju	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva OSIM: Saprofitne bakterije kože se ne izdaju Pretraga ne uključuje <i>Ch. trachomatis</i> (vidi: Laboratorij za molekularnu i citološku dijagnostiku)
Bris ždrijela	Bris u sterilnoj	Sterilnim štapićem treba	ST	ST / 24 sata	BHS-A

	epruveti za N.gonorrhoeae u Amies ugljeni transportni medij*	obrisati tonzile (lukove ždrijela) te stražnju stijenku farinksa, pazeci pritom da se ne dotakne jezik ili bukalna sluznica		za N.gonorrhoeae unutar 12 sati  Ako uzorak nije moguce poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom mediju	Ako se traži neki drugi uzročnik treba naznačiti na uputnici
Bris / aspirat nazofarinks	Bris u sterilnoj epruveti	Tankim sterilnim štapićem lagano ući u nazofarinks prateći smjer nosnog hodnika, lagano rotirati štapić	ST	ST / 24 sata  Ako uzorak nije moguce poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom mediju	<i>S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, BHS-A</i>  Ako se traže neki drugi uzročnici ( <i>N.meningitidis</i> ) treba naznačiti na uputnici  Bris nazofarinks nije kvalitetan uzorak (nedovoljno specifičan i nedovoljno osjetljiv) za otkrivanje uzročnika upale srednjeg uha ili sinusa
Bris / aspirat nazofarinks na <i>Bordetella pertusis</i>	Bris u sterilnoj epruveti	Tankim sterilnim štapićem lagano ući u nazofarinks prateći smjer nosnog hodnika, lagano rotirati štapić	ST  Što hitnije dostaviti u laboratorij	ST / 24 sata  Ako uzorak nije moguce poslati odmah treba ga slati u transportnom mediju	<i>Bordetella pertusis</i>  Pozitivni rezultati se javljaju telefonom  Nalaz se izdaje za 7 dana ukoliko nije bio pozitivan
Bris nosa na <i>Staphylococcus aureus</i> ili MRSA	Bris u sterilnoj epruveti	Sterilni štapić navlažiti u sterilnoj fiziološkoj otopini, 5 puta čvrsto rotirati štapić brišući unutarnji kožni nabor prvo jedne, a potom istim štapićem i druge nosnice (do 1-2 cm dubine)	ST	ST / 24 sata	<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA  Na uputnici naznačiti da li se traži detekcija stafilokoknog klionoštva ili se radi o rani unutar nosnog hodnika
Sputum: a) ekspektorirani b) inducirani	Sterilna posuda s navojem	a) Prije davanja sputuma pacijent treba izaprati (grgljati) usta vodom te	ST	a) +4°C / 24 sata ekspektorirani	<i>S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, BHS-A, S.aureus</i>

		<p>pokušati proizvesti „duboki“ iskašljaj</p> <p>b) iskašljavanje se inducira inhalacijom 3-10% sterilne fiziološke otopine</p>		<p>b) ST / 24 sata inducirani</p>	<p>Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na gljive osim <i>Candida</i> spp. (naznačiti na uputnici)</p> <p>Ako se traže neki drugi uzročnici (<i>P.aeruginosa</i> kod cistične fibroze) treba naznačiti na uputnici</p> <p>Rutinska obrada ne uključuje tuš preparat i preparat po Ziehl-Neelsenu (po potrebi naznačiti na uputnici)</p> <p>Kvalitetnim uzorkom se smatra onaj iskašljaj u kojem ima puno (<math>&gt;25</math> u vidnom polju) polimorfonukleara i malo (<math>&lt;10</math> u vidnom polju) epitelnih stanica. Velik broj epitelnih stanica ukazuje da se radi o ispljuvku, a ne iskašljaju</p>
Bronhoalveolarna lavaža (BAL) Endotrahealni aspirat	Sterilna posuda s navojem od 15 ml	BAL se uzima tijekom bronhoskopije Endotrahealni aspirat se uzima preko sterilnog katetera	ST	+4°C / 24 sata	<p>Bilo koja vrsta bakterija i gljiva</p> <p>Fiziološka flora gornjeg dišnog sustava se ne izdaje</p> <p>Mali broj bakterija u kvantitativnom uzgoju ukazuje na vjerojatnu kontaminaciju – interpretacija ovisi i o vrsti nađene bakterije</p> <p>Telefonski dogovoriti dulju inkubaciju kod sumnje na gljive osim <i>Candida</i> spp. (naznačiti na uputnici)</p> <p>Rutinska obrada ne uključuje tuš preparat i preparat po Ziehl-Neelsenu (po potrebi naznačiti na uputnici)</p>

ST = sobna temperatura

## Uzorci iz probavnog sustava

### Na uputnici obavezno navesti slijedeće:

- podatci o pacijentu (ime i prezime, godina rođenja, odjel)
- dijagnoza
- da li pacijent uzima antimikrobnu terapiju, ako da koju
- vrsta uzorka
- vrsta pretrage
- datum i vrijeme uzimanja uzorka
- ime nadležnog liječnika

UZORAK	Posuda	Uzimanje materijala	Transport (odmah po uzimanju)	Pohranjivanje (samo ako transport nije moguć odmah)	Očekivani patogeni
Stolica	Čista, nepropusna posuda	Dovoljno je žličicom čepa zagrabitи oko 1-2 g proljevaste stolice ili grumen veličine lješnjaka u slučaju formirane stolice	ST	+4°C / 24 sata  U transportnom mediju +4°C / 48h	Rutinska obrada uključuje salmonele, šigele, jersiniju i kampilobakter, <i>E.coli</i> O157,O124 ako se traže drugi uzročnici naznačiti na uputnici
Bris rektuma (Bris ili uzorak iz pelene manje osjetljivi od stolice)	Bris u sterilnoj epruveti	Uzeti bris do dubine od 2,5cm od analnog sfinktera ( feces mora biti vidljiv na brisu zbog detekcije dijarealnih patogena)	ST	ST / 24h	<i>Shigella</i> spp, <i>Salmonella</i> spp.
Stolica na <i>Vibrio cholerae</i>	Alkalna peptonska voda za <i>Vibrio cholerae</i>	Dovoljno je žličicom čepa zagrabitи oko 1-2 g proljevaste stolice ili grumen veličine	+4°C	U alkalnoj peptonskoj vodi do 6 h	<i>Vibrio cholerae</i>

	Podlogu zatražiti u mikrobiološkom laboratoriju	Iješnjaka u slučaju formirane stolice. Uzorak uzeti u ranoj fazi bolesti.		(prethodno ohladiti medij 1-2 h)	
Stolica na rotavirus i adenovirus	Čista, nepropusna posuda	Dovoljno je žličicom čepa zagrabitи oko 1-2 g proljevaste stolice ili grumen veličine Iješnjaka u slučaju formirane stolice.	ST	+4 C / ≤24 sata ≥24h -20°C	Rotavirus Adenovirusi
Bioptat želuca na <i>H. pylori</i>	Sterilna posuda s navojem + transportni medij (brucela bujon s 20% glicerola, Stuart transportni medij ili Portagerm pylori)	Uzorak se uzima tijekom gastroskopije . Preporuča se uzorak uzeti s više mjesta kako bi vjerojatnost izolacija bila što veća	≤1h ST	+4 C / ≤24 sata u transportnom mediju	<i>H. pylori</i>
<i>C. difficile</i> dokaz toksina A i B	Čista, nepropusna suha posuda >5 ml	Dovoljno je žličicom čepa zagrabitи oko 1-2 g proljevaste stolice ili grumen veličine Iješnjaka u slučaju formirane stolice. Testiranje formirane ili tvrde stolice nije preporučljivo (pacijent bi trebao imati ≥5 tekućih ili mekih stolica na dan). 1-2 uzorka mogu biti potreba za detekciju niskih razina toksina	≤1h ST	1-24 +4°C >24 -20°C (oprez- brz gubitak aktivnosti citotoksina)	Toksikogeni soj <i>C. difficile</i>  U dječjoj dobi česta je kolonizacija toksikogenim sojevima

ST = sobna temperatura

## Uzorci iz urogenitalnog sustava

### Na uputnici obavezno navesti slijedeće:

- podatci o pacijentu (ime i prezime, godina rođenja, odjel)
- dijagnoza
- da li pacijent uzima antimikrobnu terapiju, ako da koju
- vrsta uzorka
- vrsta pretrage
- datum i vrijeme uzimanja uzorka
- ime nadležnog liječnika

UZORAK	Posuda	Uzimanje materijala	Transport (odmah po uzimanju)	Pohranjivanje (samo ako transport nije moguć odmah)	Očekivani patogeni (kultivacija ne uključuje <i>M. tuberculosis</i> )
Urin	Sterilna posuda s navojem	Spolovilo oprati sapunom i vodom ili u ambulantnim uvjetima sterilnom fiziološkom otopinom (jednim potezom tupfera u smjeru od naprijed prema otraga). Prvi mlaz ispustiti, a srednji uhvatiti u sterilnu posudu.	ST  +4 C ako se očekuje da će od uzimanja do nasadivanja uzorka proći > 2h	+4°C / 24 sata	<p><i>E.coli</i> i <i>S.saprophyticus</i> (u mlađih žena) izdaju se ako su prisutni u čistoj kulturi u količini <math>\geq 10^3</math> cfu/ml.</p> <p>Ostale bakterije se izdaju ako su prisutne u čistoj kulturi u količini <math>\geq 10^4</math> cfu/ml</p> <p>U interpretaciji nalaza potrebno je uzeti u obzir biokemijski nalaz urina i kliničku sliku.</p> <p>Kod trajnog urinarnog katetera uzorak ne uzimati bez kliničkih simptoma upale - na uputnici</p>

					naznačiti da se radi o kateter urinu
Bris cerviksa, vagine	Bris u sterilnoj epruveti	Bris cerviksa se uzima pri ginekološkom pregledu spekulima – prvim brisom odstraniti sekret te drugim brisom uzeti uzorak iz endocervikalnog kanala	ST	ST / 24 sata	<p><i>Staphlococcus aureus</i>, BHS-A, BHS-B, <i>Candida albicans</i></p> <p>Detekcija <i>Gardnerella vaginalis</i> se zasniva na preparatu po Gramu</p> <p>Navedene bakterije se u genitalnom traktu nalaze i normalno kao dio fiziološke ili kolonizirajuće flore, ali kad se nađu kao dominantan izolat mogu biti povezani s određenim kliničkim simptomima</p> <p>Kod djece su u brisu vagine / vulve mogući i respiratorni patogeni</p> <p>Detekciju <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>Actinomyces</i> </p>
Bris cerviksa, vagine na BHS/B	Bris u sterilnoj epruveti		ST	ST / 24 sata	Ciljana pretraga na BHS/B je indicirana u trudnica pred porod (35.tj. trudnoće)
Bris cerviksa, vagine, uretre na <i>N.gonorrhoeae</i>	Amies ugljeni transportni medij		ST	ST / 24h	<i>N.gonorrhoeae</i>

					Za PCR dijagnostiku vidi: Laboratorij za molekularnu i citološku dijagnostiku
Eksprimat prostate, ejakulat	Sterilna posuda s navojem	Eksprimat prostete se dobiva masažom prostate kroz rektum. Ne preporuča se u tijeku akutnog prostatitisa.	ST	ST / 24 h	Bilo koja vrsta bakterija i gljiva  Eksprimat prostate se izdaje kvantitativno. Za interpretaciju nalaza je uputno uspoerditi porast bakterija iz eksprimata s porastom bakterija iz prvog, drugog i treceg (nakon eksprimata) mlaza urina – 10x veći broj bakterija u 1. i 2. mlazu urina negoli u eksprimatu prostate i 3. mlazu ukazuje da bakterije potječu iz mjeđura ili uretre, a ne prostate
Bris cerviksa, uretre, ejakulat, eksprimat prostate, urin na <i>Mycoplasma hominis</i> i <i>Ureaplasma urealyticum</i>	Specijalne transportne podloge koje se dobiju u laboratoriju	Bris uretre (tanki sterilni bris staviti 2-4 cm u lumen uretre, rotirati ga) ili bris cerviksa uroniti u transportnu podlogu i dobro protresti te potom bris odbaciti a podlogu dostaviti u laboratorij	ST	ST / 24 h	<i>Mycoplasma hominis</i> i <i>Ureaplasma urealyticum</i> mogu predstavljati saprofitnu floru. Nalaz ovih bakterija u kolicini $\geq 10^4$ cfu/ml govori u prilog infekciji te se izdaje s antibiogramom

ST = na sobnoj temperaturi

## Uzorci za molekularnu dijagnostiku

### Na uputnici obavezno navesti slijedeće:

- podatci o pacijentu (ime i prezime, godina rođenja, odjel)
- dijagnoza
- da li pacijent uzima antimikrobnu terapiju, ako da koju
- vrsta uzorka
- vrsta pretrage
- datum i vrijeme uzimanja uzorka
- ime nadležnog liječnika

<b>UZORAK</b>	<b>Posuda</b>	<b>Uzimanje materijala</b>	<b>Transport</b>	<b>Pohranjivanje</b>	<b>Metoda pretrage</b>
Puna krv Likvor na <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>N.meningitidis</i></li><li>- <i>S.pneumoniae</i></li><li>- <i>L.monocytogenes</i></li><li>- <i>S.aureus</i></li><li>- <i>Staphylococcus</i> spp / <i>S.aureus</i></li><li>- Meticilin rezistentni stafilokok (MRSA / MRSE)</li></ul>	Epruveta s antikoagulansom (EDTA)	Prije venepunkcije / lumbalne punkcije kožu dezinficirati 70% alkoholom Uzeti $\geq$ 1ml likvora Uzeti $\geq$ 2ml krvi	ST  Uzorak dostaviti u laboratorij što hitnije  U slučaju duljeg transporta uzorak zalediti i poslati zaleden	Punu krv / likvor zalediti na -20°C	Real time PCR, LightCycler (Roche)
Soj za identifikaciju	Čista kultura bakterija u dubokom agaru		ST	ST Dulje pohranjivanje na -20°C	

ST = na sobnoj temperaturi