

# SEKCIJA ZA IMUNOLOGIJU INFЕKTIVNIH BOLESTI HRVATSKOG DRУSTVA ZA INFЕKTIVNE BOLESTI HLZ-a



## PRIJENOS HANTAVIRUSA:

- direktnim kontaktom s glodavcima
- udisanjem **zaraženog zraka** od izlučevina glodavaca (**mokraća, izmet, slina**)
- zaraženim, **neopranim** voćem i povrćem

Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.




## NE MESTI!

Smočite moguće zagađeno područje **sredstvom za dezinfekciju koje sadrži klor ili alkohol** i oprezno očistite bez podizanja prašine.  
Koristite masku i gumene rukavice.



Izbjegavajte kontakte s glodavcima i njihovim izlučevinama.  
Držite mjesto boravka čistim.  
**Prozračite** vikendice, garaže, podrumе **prije ulaska ili čišćenja**.  
Izbjegavajte ležanje na zemlji.



**Spriječite ulazak glodavaca.**  
Zatvoriti rupe betonom ili metalnim štitnikom.  
Pokosite travu i grmlje u okolini kuće (do 50 m).



Virusna bolest - uzrokuju hantavirusi

**PERITE RUKE** sapunom i topлом vodom nakon rada na kući, okućnici i boravka u prirodi.

Ne dirajte lice prljavim rukama.  
U prirodi koristite mokre maramice na bazi alkohola.

**PRIJENOSNICI HANTAVIRUSA U HRVATSKOJ:**  
sitni šumski glodavci (voluharice, šumski i poljski miševi)



**SIMPTOMI BOLESTI:**  
povišena temperatura, jaka glavobolja, zimica, bolovi u ledjima i trbuhi, mučnina, zamućenje vida.  
Javljuju se **unutar 1-2 tjedna**, no mogu se javiti i nakon 45 dana.



Osigurajte hranu i piće od pristupa glodavaca.  
Pospremite svu hranu i smeće u **zatvorene spremnike**.  
Uskladištite hranu i vodu za kućne ljubimce i/ili domaće životinje.  
Sve sirove plodove ubrane u šumi i poljima **temeljito operite** prije jela.



**Uklonite mesta pogodna za sklonište glodavaca.**  
Podignite od zemlje sve spremnike, sijeno i premjestite ih barem **50 m od kuće**.  
Odstranite krupni otpad.



**Ne uništavajte prirodne grabežljivce glodavaca:**  
- zmije (poskok, riđovka, bjelica)  
- ptice (sove, škanjac, jastreb)

